

INDICADORES DE DESIGUALDAD DE GENERO EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO.

Departamento de Investigación e
Información INSHT

Seminario: Mujeres, trabajo y salud.
27 de abril de 2011

MUJER Y TRABAJO: APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE INDICADORES DE DESIGUALDAD A TRAVÉS DE METODOLOGÍA DE ENCUESTA

Marta Zimmermann Verdejo.

Departamento de Investigación e Información. INSHT

Mayo 2009

ACERCAMIENTO A LA SINIESTRALIDAD LABORAL DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Coordinación de Información y Observatorio

Redacción: M^a Ángeles de Vicente Abad

Revisión y aportaciones: Marta Zimmermann Verdejo, M^a Victoria
de la Orden Rivera, Clara Isabel Díaz Aramburu

Enero de 2010

Índice de incidencia de accidentes de trabajo en jornada de trabajo por género y gravedad

	accidentes leves	Índice accidentes leves	accidentes graves	Índice accidentes graves	accidentes mortales	Índice accidentes mortales	accidentes totales	Índice accidentes totales
Varón	448.642	5.458,7	4.522	55,0	598	7,3	453.762	5.521,0
Mujer	162.984	2.422,2	660	9,8	34	0,5	163.678	2.432,5
Total	611.626	4.091,8	5.182	34,7	632	4,2	617.440	4.130,7

Fuente: Base informatizada de partes de declaración de accidentes de trabajo 2009. MTIN

En 2009 los hombres sufrieron 2,3 veces más accidentes de trabajo, 5,6 veces más en accidentes graves y... su siniestralidad mortal fue 14 veces mayor.

Pero, si miramos con más detalle...

- En **seis ramas de actividad** las trabajadoras presentan más incidencia que los trabajadores: Actividades de saneamiento público; Instituciones financieras y seguros; Educación; Actividades informáticas. Investigación y desarrollo; Actividades sanitarias y veterinarias. Servicios Sociales; y Hostelería (2008).
- Por **ocupación**, las trabajadoras presentan más riesgo de sufrir un accidente de trabajo cuando son: Trabajadoras cualificadas de extractivas, metalurgia, y construcción de maquinaria; Trabajadoras de servicios de seguridad; Profesionales de segundo y tercer ciclo universitario; Profesionales de primer ciclo universitario; y Conductoras. Operarias de maquinaria móvil (2008).

VI ENCT 2007

INDICADORES:

Exposición a agentes químicos

Factores de carga física

Factores de carga mental y factores psicosociales

Molestias posturales


Actividades preventivas

EL ANALISIS

- Diferencia de prevalencias entre hombres y mujeres
- Perfiles de exposición entre las mujeres
- Diferencias entre expuestos y expuestas en relación a otras variables de interés



Exposición a agentes químicos




En la muestra total, el 32% de los hombres contestaron afirmativamente frente al 20,4% de las mujeres

Exposición a agentes químicos


MUJERES: prevalencia de exposición

- Agricultores, ganaderos, pescadores y marineros
- Serv. doméstico, limpieza; cocineros, camareros; barrenderos
- Personal sanitario
- Estudios primarios
- Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales
- Industria química
- Agricultura, ganadería, caza y pesca
- Total




Exposición a agentes químicos

Distribución de expuestos: HOMBRES VS MUJERES



Exposición a agentes químicos

Distribución de expuestos: HOMBRES VS MUJERES




Factores de carga física

<i>“siempre o casi siempre expuesto”</i>	HOMBRES	MUJERES	P
Mantener una misma postura	21,7%	24,7%	P<0,001
Realizar movimientos repetitivos de manos o brazos	26,4%	29,0%	P=0,003

PERFIL DE EXPOSICIÓN: HOMBRES VS MUJERES


Posturas estáticas



Factores de carga física

PERFIL DE EXPOSICIÓN: HOMBRES VS MUJERES

Movimientos repetitivos de mano-brazo




Factores de carga mental y factores psicosociales


<i>“siempre o casi siempre expuesto”</i>	HOMBRES	MUJERES	P
Realizan tareas muy repetitivas y de muy corta duración	21,2%	23,4%	0,007
Atienden a varias tareas al mismo tiempo	18,5%	21,8%	0,000
Tratan directamente con personas que no son empleados	39,9%	51,6%	0,000
Trabajan con ordenadores	20,7%	29,0%	0,000
No pueden recibir ayuda externa si la pide	28,8%	31,5%	0,003
No tienen libertad para decidir vacaciones o días	22,9%	25,8%	0,000

Factores de carga mental y factores psicosociales

Número de factores psicosociales acumulados: comparación según sexo y sector



Molestias posturales



Perfil de exposición en Mujeres por localización anatómica

El dolor de nuca/cuello fue más frecuente en:

- ✓ Mujeres de mayor antigüedad;
- ✓ Trabajadoras de estudios superiores;
- ✓ Ramas dispares que abarcan los cuatro sectores de actividad; y
- ✓ Su aparición se asoció a la edad.

El dolor de brazos, fue más frecuente entre:

- ✓ Las trabajadoras de estudios primarios;
- ✓ Las rama de metal y agrario.
- ✓ Se asoció con la edad.

La lumbalgia se asoció con:


- ✓ La edad y la antigüedad;
- ✓ Trabajadoras con estudios primarios y
- ✓ Trabajadoras de Asistencia sanitaria/veterinaria.

El dolor de piernas se dio con una mayor frecuencia entre:

- ✓ Trabajadoras con estudios primarios y
- ✓ Rama de comercio/hostelería.
- ✓ No se asoció ni a la edad, ni a la antigüedad


Molestias posturales

FACTORES ASOCIADOS A LA PRESENCIA DE MOLESTIAS OSTEOMUSCULARES. ANÁLISIS AJUSTADO. MUJERES



Actividades preventivas

La formación e información en seguridad y salud en el trabajo



Respondieron afirmativamente el 57,9% de los hombres y el 48,8% de las mujeres, resultando estas diferencias estadísticamente significativas.

Actividades preventivas


La ausencia de formación/información: perfil de las Trabajadoras

La formación o información en SST, fue menos frecuente entre:

- Aquellas trabajadoras que llevan un año o menos en el puesto;
- Las mujeres con estudios primarios;
- Las más jóvenes y
- Entre las pertenecientes a Otras Actividades sociales y personales; al Sector Agrario y a Comercio y Hostelería.

Actividades preventivas

La evaluación o análisis de riesgos en el puesto



Respondieron afirmativamente el 36,2% de los hombres y el 29,3% de las mujeres, resultando estas diferencias estadísticamente significativas.

Actividades preventivas


La ausencia de evaluación: perfil de las Trabajadoras

La evaluación de riesgos fue menos frecuente entre:

- Aquellas trabajadoras que llevan un año o menos en el puesto
- Las mujeres con estudios primarios (para estas dos variables, además se describe una tendencia lineal creciente) ;
- Las más jóvenes y
- Las pertenecientes a otras actividades sociales y personales; al sector agrario y a comercio y hostelería.

Actividades preventivas

Ofrecimiento de reconocimiento médico por parte de la empresa



Respondieron afirmativamente el 66,4% de los hombres y el 55% de las mujeres, resultando estas diferencias estadísticamente significativas.

Actividades preventivas

La ausencia de reconocimiento médico

La posibilidad de pasar un reconocimiento médico fue menos frecuente entre:

- Aquellas trabajadoras que llevan un año o menos en el puesto y
- En las mujeres con estudios primarios (para estas dos variables, además se describe una tendencia lineal creciente) ;
- Entre las más jóvenes y
- Entre las pertenecientes a otras actividades sociales y personales; al sector agrario y a comercio y hostelería.

Recopilando evidencias.....

- Desigualdades en la exposición y percepción de daños y molestias entre hombres y mujeres
- Diferente (menor) esfuerzo preventivo para atajar riesgos que afectan más a mujeres
- Importantes diferencias intra-género: rama actividad, ocupación, nivel estudios, edad y antigüedad y otras (clase social, estatus laboral, etnia...) y, muy en especial, trabajo en el hogar

Aplicándolas en las políticas

Nueva Estrategia de Seguridad y Salud europea y española
2013 -.....